

**Quadro 1:** Esquema vacinal, idades e intervalos.

VACINA	Nº DOSES		IDADE RECOMENDADA	IDADE MÁXIMA	INTERVALO ENTRE AS DOSES		OBSERVAÇÃO
	ESQUEMA BÁSICO	REFORÇO			RECOMENDADO	MÍNIMO	
<b>BCG</b>	Dose única	-	Ao nascer	Prioritariamente até 15 anos	-	-	
<b>Hepatite B</b>	Ao nascer	-	Ao nascer	30 dias	-	-	
<b>Poliomielite 1,2,3 - VIP inativada</b>	3 doses	2 reforços com VOP	2 meses, 4 meses e 6 meses	Recomendada para crianças e adolescentes até 19 anos	60 dias	4 semanas	
<b>Poliomielite 1 e 3 - VOP atenuada</b>	-	2 doses de reforço	15 meses e 4 anos	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	-	1º ref: 6 meses após 3ª dose da VIP 2º ref: 6 meses após 1º ref.	
<b>Rotavírus humano G1P1</b>	2 doses	-	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses	1ª dose: 3 meses e 15 dias 2ª dose: 7 meses e 29 dias	60 dias	4 semanas	
<b>DTP+Hib+HB (Penta)</b>	3 doses	2 reforços com a vacina DTP	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses 3ª dose: 6 meses	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	4 semanas	Idade mínima: Não deve ser administrada antes de 6 semanas
<b>Difteria, tétano, Pertussis (DTP)</b>	-	2 reforços	1º reforço: 15 meses 2º reforço: 4 anos	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	6 meses	1º ref: 6 meses após 3ª dose da PENTA 2º ref: 6 meses após 1º ref. DTP	
<b>Pneumo 10 valente</b>	2 doses	Reforço	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses Reforço: 12 meses	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	4 semanas da 1ª para 2ª dose e de 60 dias da 2ª doses para o reforço	Idade mínima: Não deve ser administrada antes de 6 semanas
<b>Meningo C</b>	2 doses	1º reforço	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses Reforço: 12 meses	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	4 semanas da 1ª para 2ª dose e de 60 dias da 2ª doses para o reforço	Temporariamente pode ser administrada até 10 anos
<b>Febre Amarela</b>	1 dose	Reforço	Dose: 9 meses Reforço: 4anos	-	-	4 semanas	Com 5 anos ou +: Se recebeu apenas 1 dose antes de 5 anos, deve receber dose adicional

VACINA	Nº DOSES		IDADE RECOMENDADA	IDADE MÁXIMA	INTERVALO ENTRE AS DOSES		OBSERVAÇÃO
	ESQUEMA BÁSICO	REFORÇO			RECOMENDADO	MÍNIMO	
<b>Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR)</b>	2 doses (1ª dose com SCR e 2ª dose com SCRv)	-	12 meses	Nascidos a partir de 1960	-	4 semanas	
<b>Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela (SCRv)</b>	1 dose (corresponde a segunda dose de SCR e primeira dose de varicela)	-	15 meses	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	-	4 semanas	
<b>Hepatite A</b>	1 dose	-	15 meses	Até 4 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	
<b>Varicela</b>	1 dose (corresponde a segunda dose de SCR e primeira dose de varicela)	-	4 anos	Até 6 anos, 11 meses e 29 dias	-	4 semanas	
<b>Papiloma vírus humano 6,11,16,18 (HPV)</b>	2 doses	-	Meninas: 9 a 14 anos Meninos: 11 a 14 anos	14 anos	6 meses	6 meses	
<b>Meningo ACWY</b>	1 dose	-	11 e 12 anos	12 anos	-	-	Independente de ter recebido anteriormente a vacina Meningocócica C

**ATENÇÃO:** crianças que se encontrem em situações ou condições clínicas especiais deverão ser avaliadas e vacinadas se houver indicação pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

**Vacinação Simultânea:** A vacina febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral na primovacinação de crianças menores de dois anos de idade, devendo as administrações ser espaçadas pelo menos quatro semanas, pela possibilidade de interferência na resposta imune a estes agentes.

Criança com idade entre um e dois anos, que não tenha recebido as vacinas tríplice viral e febre amarela, deverá receber inicialmente a vacina tríplice viral, seguida da vacina febre amarela quatro semanas após.